

此药会影响生育吗？

硫唑嘌呤不会影响您的生育能力。怀孕或哺乳期间可继续服用。但您所患的疾病本身可能会响怀孕。如果您有计划生育，请先咨询医生。

服药期间可注射疫苗吗？

可接种肺炎球菌、流感、甲型和乙型肝炎、破伤风疫苗。但须避免注射活疫苗（如小儿麻痹症、水痘、麻疹、腮腺炎和风疹（MMR））。

硫唑嘌呤以外有其他选择吗？

您的医生会与您商讨最安全有效的治疗方案。若有任何疑问，请咨询您的医生。

国立大学医院

5 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119074
Website: www.nuh.com.sg

Company Registration No. 198500843R

药房 (医院主楼): 6772 5181/5182

药房 (肯特岗翼): 6772 5184

药房 (国立大学医院医疗中心): 6772 8205

此药物须知仅用于教育用途，并不能替代医学诊断或治疗。若您对您的健康状况有任何疑问，请在开始接受治疗前咨询医生或医护人员。此药物须知更新至（月/年），及后如有更改，恕不另行通知。

版权 2014, 国立大学医院

版权所有。未经国立大学医院的书面许可，不得复制任何内容。

A member of the NUHS



药物须知

硫唑嘌呤

AZATHIOPRINE



硫唑嘌呤的主要作用是什么？

硫唑嘌呤是一种免疫抑制药物，用于治疗系统性红斑狼疮、结缔组织病、严重湿疹、血液病、脑内科疾病 (如重症肌无力)；还可以防止器官移植病人产生排斥反应。

服用硫唑嘌呤可让医生逐步调低类固醇的剂量。此药通过调节免疫系统功能而发挥作用，必须小心使用。

应该如何服用此藥？

每天1至2次，饭后口服。

应该服用多少？

剂量因人而异。医生一般会先处方较低的剂量，然后按病情需要上调。

服用多久后才能见效？

服用硫唑嘌呤不会立刻见效。病人一般于服药6至12星期后感受到药物的疗效。

服药期间须要验血吗？

服药期间可能会出现造血功能异常和肝功能异常等副作用。及早发现一般可以改正。安全起见，病人须在服药期间进行血常规检查。

须避免服用其他药物吗？

一般而言，病人应告知医生或药剂师自己正在服用或打算服用的其他药物，这包括保健食品和非处方药物。别嘌醇 (痛风药物) 会影响硫唑嘌呤的药效，未必适合与硫唑嘌呤合用。如您正在服用别嘌醇，请让医生知道。

可以喝酒吗？

服药期间可喝适量的酒。

忘记了服用应该怎么办？

如果您漏服一次，请在想起漏服的时候立即服用。但若接近下次服药时间，则等到下次服药时间再服用。**请勿增加剂量补服。**

硫唑嘌呤有哪些副作用？

| Side effects | Warning signs | Things you need to do |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| 口腔溃疡、皮疹 | | 停药并就医。 |
| 恶心、呕吐、腹痛、腹泻 | | 医生可能会调整药量。 |
| 脱发 | | 短暂性，一般可以透过减药改善情况。 |
| 血球数量下降 | 容易瘀伤、严重喉痛、疲倦、苍白 | 按医嘱进行血常规检查。 |
| 肝酶升高 | 眼睛变黄、小便呈现茶色、持续腹痛 | 如曾患肝病，请通知医生。按医嘱进行肝功能检查。 |
| 轻微增加患上癌症的机会 (皮癌、淋巴瘤) | | 如曾患癌症，请通知医生。每天涂防晒霜。 |
| 较容易感染传染病 | | 远离伤风感冒病患。跟医生商讨注射疫苗。 |

如出现以上症状，请您尽早就医。

应该如何贮存此药？

请将此药贮藏于室温下，并存放在儿童接触不到的地方。